

PRINCIPALES VARIEDADES DE UVA EN EXTREMADURA



ALARIJE

Variedad con un sarmiento largo, fuerte y ramificado. Tiene un racimo medio, algo apretado. Baya media, irregular y con poca pruina. Su zumo es incoloro.



BOBAL

Racimo pequeño, compacto y forma cónica con hombros. Brotación y madurez media y tardía. Tamaño mediano, forma esférica y color azul-negro.



BORBA

Tiene un porte de vegetación erguido. Es una de las variedades de uva más extendida de toda la región. Baya redonda y racimo menudo y prieto.



CABERNET SAUVIGNON

Madurez media-tardía. De climas templados y zonas secas. En Extremadura suele adoptar el sistema de poda en espaldera. De planta muy vigorosa.



CAYETANA BLANCA

De brotación media y maduración tardía. Es sensible al oídio, bottritis y erinosis.



CIGÜENTE

Variedad perfectamente adaptada a suelos arenosos y pobres. Época de brotación media. Se adapta bien a la poda en vaso. Sensible a enfermedades criptogámicas.



EVA O BEBA

De gran producción, vigorosa y de porte rastrero. Sensible a las bajas temperaturas y a la humedad. Oscila su producción en función de las condiciones climatológicas.



GARNACHA TINTA

Brotación y madurez media. Se desarrolla bien en terrenos pedregosos o arcillosos y sitios ventilados y en ladera, con clima relativamente cálido. Resiste el oidium.



GARNACHA TINTORERA

Bien adaptada a la zona produciendo uvas de buena calidad. De brotación precoz. Prolifera su poda en espaldera con apoyo de riego. Sensible al mosquito verde.



GRACIANO

Buen vigor, brotación y maduración tardía. Resistente a enfermedades. Racimos de dos hombros cilíndricos cortos, menos destacados que la tempranillo.



JAÉN TINTO

Época de brotación media. De racimos pequeños y compactos y muy buen rendimiento. En Extremadura se realiza su poda en vaso.



MALVAR

Brotación entre temprana y media, y madurez temprana. Resulta una variedad muy atacada por los pájaros, por su pronta maduración.



MAZUELA

Brotación y maduración tardía. Cultivada en Tierra de Barros, desde hace poco con buenos resultados. Altas temperaturas maduran sus compactos racimos.



MERLOT

Brotación precoz-media y floración tardía. Posee un clon adaptado a la sequía y otro rústico cultivable en cualquier lugar. Resistente a la clorosis férrica.



MONASTRELL

Resistente a la sequía. De brotación tardía y madurez muy tardía, por lo que no se aclimata bien a todas las situaciones pudiendo llegar a madurar insuficientemente.



MONTÚA

Gran producción, vigorosa y porte rastrero. Sensible a las bajas temperaturas y humedad provocando oscilaciones en la producción de unos años a otros.



MOSCA TEL DE ALEJANDRÍA

Cepa semierguída y racimo mediano, muy suelto y forma cilíndrica a veces con alas. Brotación y madurez tardía. Baya grande, elíptica larga y color amarillo pajizo.



MOSCA TEL DE GRANO MENUDO

De brotación precoz es una variedad de regiones cálidas o muy templadas. Adaptada a terrenos calcáreos no muy arcillosos ni muy húmedos. Resistencia media a la sequía.



PARDINA

Vigorosa y muy fértil, es una de las principales variedades cultivadas en Badajoz. De ella se obtienen vinos francos de gusto, afrutado y de color pálido.



PARELLADA

Brotación temprana-media y madurez tardía. Adaptada a zonas Has, no exige terrenos de calidad. Resiste bien enfermedades criptogámicas, Sensible al oídio y la sequía.



PEDRO XIMENEZ

Variedad meridional bien adaptada a climas calurosos y con mucha iluminación que permite un excelente maduración. Sensible al mildiu.



PERRUNO

Variedad adaptada a suelos arenosos y pobres. Resiste medianamente la sequía. Se adapta bien a la poda en vaso. Sensible a enfermedades criptogámicas.



PINOT NOIR

Adaptada a suelos no muy fértiles y húmedos; climas templados y sol. Prefiere espalderas con densidades alias. Sensible al mildiu, oídio y podredumbre gris.



SAUVIGNON BLANC

Prefiere terrenos no muy fértiles. bien expuestos, climas secos y templados. Resistencia media a enfermedades criptogámicas y botrytis en particular.



SYRAH

Brotación tardía y madurez media. Precisa podas largas para fructificar. Es sensible a botrytis, clorosis, ácaros y a la sequía. Su mosto posee altos contenidos en taninos.



TEMPRANILLO

Madurez medio-temprana. Vigorosa y adaptable. Poco sensible a heladas de primavera pero sí a vientos cálidos. Generalizada en toda Extremadura.



VERDEJO

De época de brotación precoz. Bien adaptada a la poda en vaso. Su racimo es grande, compacto y de bayas grandes.



VIURA O MACABEO

Variedad vigorosa, de racimo grande y compacto, grano redondo, mediano y de piel fina. Época de brotación media. Excesiva producción incide en su calidad.